

# MALADIES VECTORIELLES

## Les connaître pour se protéger



# MALADIE DE LYME

ET PRÉVENTION DES PIQÛRES DE TIQUES

# Je reconnaiss la maladie et ses symptômes

# J'apprends à me protéger

## • LA MALADIE DE LYME : QU'EST-CE QUE C'EST ?

**La maladie de Lyme, ou Borréliose de Lyme,** est une infection due à une bactérie (microbe) transportée par une tique. La tique peut transmettre la bactérie à l'homme au moment d'une piqûre.

**La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.**

Elle ne se transmet pas par contact avec un animal porteur de tiques (oiseaux, chiens, chats) ni d'une personne à une autre.

**Toutes les tiques ne sont pas infectées par la bactérie responsable de la maladie de Lyme.**



## • COMMENT SE PROTÉGÉR AVANT LES ACTIVITÉS DANS LA NATURE ?

La meilleure façon de se protéger lors de promenades à la campagne, en forêt, dans la nature ou dans les parcs, c'est d'éviter de se faire piquer par des tiques. Il est donc conseillé de porter des vêtements longs qui couvrent les bras et les jambes, un chapeau, et de rentrer le bas du pantalon dans les chaussettes.

**Restez sur les chemins**, évitez les broussailles, les fougères et les hautes herbes. On peut aussi mettre des répulsifs contre les insectes sur la peau ou sur les vêtements, en respectant leur mode d'emploi. Pensez à prendre avec vous un tire-tique (disponible en pharmacie).

## • QUELS SONT LES SIGNE(S) ?

Dans les 3 à 30 jours après la piqûre, la maladie de Lyme peut apparaître d'abord sous la forme d'une plaque rouge qui s'étend en cercle (érythème migrant) à partir de la zone de piqûre, puis disparaît en quelques semaines à quelques mois.


Avec ou sans plaque rouge, il faut consulter un médecin en cas de symptôme grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle quelques semaines ou quelques mois après la piqûre. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.

Au bout de plusieurs mois ou année, en l'absence de traitement des atteintes graves des nerfs, des articulations, du cœur et de la peau peuvent s'installer.

## • QUE DOIS-JE FAIRE EN CAS DE PIQÛRE ?


### COMMENT RETIRER UNE TIQUE ?

- Ne mettre aucun produit sur la tique.
- Ne tentez pas de la retirer avec les ongles.



Après avoir enlevé la tique, désinfectez la peau avec un antiseptique.

### OU, À DÉFAUT,



Utilisez une pince fine : saisissez la tique à la base sans l'écraser et tirer vers le haut sans tourner.

Attention, une fois enlevée, la tique peut encore piquer. Après l'avoir tuée, sans l'avoir touchée à mains nues, il faut la mettre dans un mouchoir ou sur un bout de scotch qu'on jettera à la poubelle.

### Y A-T-IL UN TRAITEMENT APRÈS UNE PIQÛRE DE TIQUE ?

En cas de piqûre, surveillez la zone piquée. Si une plaque rouge et ronde qui s'étend en cercle ou d'autres symptômes [symptômes grippaux, paralysie, etc.] apparaissent dans le mois qui suit la piqûre, consultez sans tarder un médecin. Un traitement antibiotique pourra alors être prescrit.

# J'identifie les situations à risque

## • OÙ TROUVE-T-ON LES TIQUES ?

Les tiques sont répandues partout en France, surtout en dessous de 1 500 m d'altitude. Elles vivent dans des zones boisées et humides, les herbes hautes des prairies, les jardins et les parcs forestiers ou urbains.



## • QUI SONT LES PERSONNES LES PLUS EXPOSÉES ?

**Les professionnels qui travaillent dans la nature :**  
bûcherons, sylviculteurs, gardes forestiers,  
gardes-chasse, gardes-pêche, jardiniers, etc.

**Les amateurs d'activités dans la nature :**  
promeneurs et randonneurs en forêt, campeurs,  
chasseurs, ramasseurs de champignons, etc.



## • À QUELLE PÉRIODE DE L'ANNÉE LE RISQUE EST-IL MAXIMUM ?



Les tiques sont plus actives entre avril et novembre.

# Ce qu'il faut retenir

Les maladies vectorielles sont des maladies infectieuses transmises par des vecteurs. Les moustiques sont les vecteurs les plus connus, mais il en existe d'autres comme les tiques, les mouches, les puces, etc.

## POUR SE PROTÉGER DE LA MALADIE DE LYME :

- Avant et pendant une activité dans la nature :

**Je couvre** mes bras et mes jambes avec des vêtements longs. **Je reste** sur les chemins, j'évite les broussailles, les fougères et les hautes herbes. Je pense à prendre avec moi un tire-tique.

- Après une activité dans la nature :

**J'inspecte** soigneusement mon corps.

- Après avoir été piqué par une tique :

Je surveille la zone piquée pendant un mois. Si une plaque rouge et ronde s'étend en cercle à partir de la zone de piqûre, je dois consulter un médecin rapidement. Je consulte également en cas de symptômes grippaux, de paralysie faciale ou de fatigue inhabituelle.

**La maladie de Lyme n'est pas contagieuse.**

En cas de doute,  
parlez-en à votre médecin ou demandez  
conseil à votre pharmacien.

AUSTRALIE - R.C.S. Paris B 378 899 363. PT01-028-17DE - Crédits photos : Gettyimages - N. Boulanger; CNR Borrelia.

